

Studienleitung

AO Trauma Deutschland

Die AO Trauma Deutschland fördert die klinische und wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der wiederherstellenden und rekonstruktiven Chirurgie. Ziel ist es, innovative Behandlungsansätze weiterzuentwickeln, zu vertiefen und durch gezielte Schulungen an Fachpersonal weiterzugeben.

AO Trauma Deutschland e. V.
Luisenstr. 58/59

10117 Berlin, Deutschland

E-Mail: geschaeftsstelle@aodeutschland.de

Telefon: +49 (0)175 117 2694



Ihr Prof. Dr. med. Richard Stange und
Ihr Prof. Dr. med. Lars Großterlinden

www.ao-top.de



Für Sie erreichbar:

Ihre behandelnde Klinik

und die

AUC - Akademie der Unfallchirurgie

Emil-Riedel-Str. 5

80538 München

E-Mail: top@auc-online.de

www.ao-top.de



**BECKENRING-
FRAGILITÄTSFRAKTUREN**

Die AO TOP Studie

Ziel der AO TOP Studie ist der Vergleich zweier operativer Standardmethoden, um eine Beckenringfraktur zu stabilisieren. Es soll ermittelt werden, ob ein Verfahren für den Patienten günstiger ist und einen besseren Heilungsverlauf mit sich bringt.

Durch die Studie soll die Versorgung und Lebensqualität von Personen mit Beckenringfrakturen verbessert werden.

Ablauf der Studie

Während der Studie erhalten Sie die Standardversorgung nach Ermessen Ihrer behandelnden Ärzte.

Wir befragen Sie zu...

- demografischen Faktoren (z.B. Alter, Geschlecht) und medizinischen Daten
- Ihrem Befinden, Ihrer Wohnsituation sowie Ihrer Lebensqualität

Die Befragungen erfolgen...

- nach 6 Wochen und 3 Monaten in der Klinik
- nach 6 und 12 Monaten telefonisch oder per E-Mail

AO TOP Studie

Unterstützen Sie uns bei der Forschung zum Thema Beckenringfragilitätsfrakturen!

Beckenringfrakturen in Deutschland

Die Zahl der Beckenringfragilitätsfrakturen, verursacht durch leichtere Stürze und eine geschwächte Knochenstruktur (Fragilitätsfrakturen), nimmt in Deutschland stetig zu. Allerdings fehlt es an Evidenz zur optimalen Methode der chirurgischen Fraktur stabilisierung.

In der AO TOP Studie werden die folgenden OP-Verfahren verglichen:

- Die alleinige Stabilisierung der Beckenringfraktur im Kreuzbeinbereich
- und die kombinierte Stabilisierung im Kreuzbeinbereich und im vorderen Beckenring



www.ao-top.de

Teilnahme als Patientin oder Patient

- Ab 65 Jahren
- Patienten mit Beckenringfragilitätsfrakturen
- Begleitung ein Jahr lang nach Ihrer OP
- Etablierte medizinische Standards
- 4 Nachuntersuchungstermine (2x in der Klinik)

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren behandelnden Klinikärzten.

Sprechen Sie uns gerne an!

www.ao-top.de

